

§ ワクチン関連トピックス

トピックス I

2008 年度麻疹・風疹ワクチン接種率

2012 年の国内麻疹排除 (elimination) に向けた取り組みとして、2008 年度から 5 年間の時限措置として、中学 1 年生 (第 3 期) と高校 3 年

生相当年齢の者 (第 4 期) に、2 回目の麻疹・風疹ワクチンの接種が定期接種に導入された。2009 年 8 月に、初年度の結果が、厚生労働省健

表 1: 都道府県別麻疹含有ワクチン接種率 2008 年度最終評価 接種対象群別結果一覧

2009年9月4日回収時点

| # | 都道府県 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 北海道 | 95.2 | 92.3 | 82.0 | 79.9 |
| 2 | 青森県 | 94.3 | 94.4 | 91.1 | 84.9 |
| 3 | 岩手県 | 95.5 | 95.1 | 89.3 | 89.8 |
| 4 | 宮城県 | 96.6 | 92.7 | 88.9 | 80.2 |
| 5 | 秋田県 | 88.2 | 97.3 | 94.9 | 86.3 |
| 6 | 山形県 | 91.2 | 95.2 | 93.7 | 91.9 |
| 7 | 福島県 | 92.8 | 92.5 | 86.9 | 81.1 |
| 8 | 茨城県 | 91.7 | 93.9 | 95.1 | 80.2 |
| 9 | 栃木県 | 93.7 | 91.2 | 92.7 | 82.4 |
| 10 | 群馬県 | 93.9 | 93.5 | 90.8 | 82.8 |
| 11 | 埼玉県 | 93.2 | 92.1 | 86.1 | 74.3 |
| 12 | 千葉県 | 94.9 | 92.5 | 90.1 | 77.8 |
| 13 | 東京都 | 95.7 | 88.3 | 75.8 | 60.7 |
| 14 | 神奈川県 | 93.6 | 90.1 | 77.8 | 63.6 |
| 15 | 新潟県 | 96.4 | 95.6 | 94.2 | 89.7 |
| 16 | 富山県 | 93.4 | 95.5 | 95.3 | 88.7 |
| 17 | 石川県 | 93.9 | 94.8 | 92.5 | 86.6 |
| 18 | 福井県 | 97.0 | 96.0 | 95.5 | 91.1 |
| 19 | 山梨県 | 93.8 | 92.1 | 85.8 | 78.9 |
| 20 | 長野県 | 93.8 | 93.1 | 93.6 | 86.5 |
| 21 | 岐阜県 | 97.0 | 91.3 | 88.3 | 82.4 |
| 22 | 静岡県 | 94.1 | 91.8 | 89.4 | 82.1 |
| 23 | 愛知県 | 95.8 | 92.5 | 84.2 | 81.2 |
| 24 | 三重県 | 96.5 | 94.3 | 86.0 | 82.1 |
| 25 | 滋賀県 | 89.1 | 92.2 | 85.4 | 79.8 |
| 26 | 京都府 | 94.7 | 92.8 | 87.3 | 79.5 |
| 27 | 大阪府 | 94.1 | 88.8 | 77.2 | 68.1 |
| 28 | 兵庫県 | 94.0 | 93.7 | 85.0 | 78.8 |
| 29 | 奈良県 | 92.5 | 91.1 | 84.5 | 79.2 |
| 30 | 和歌山県 | 93.0 | 92.1 | 90.6 | 82.7 |
| 31 | 鳥取県 | 95.2 | 95.3 | 92.0 | 86.4 |
| 32 | 島根県 | 93.6 | 93.9 | 91.7 | 88.8 |
| 33 | 岡山県 | 94.8 | 94.2 | 89.3 | 79.8 |
| 34 | 広島県 | 92.3 | 90.6 | 81.0 | 74.1 |
| 35 | 山口県 | 96.7 | 91.5 | 88.9 | 83.4 |
| 36 | 徳島県 | 96.1 | 93.2 | 90.0 | 79.4 |
| 37 | 香川県 | 92.9 | 93.2 | 90.8 | 80.4 |
| 38 | 愛媛県 | 95.1 | 95.0 | 90.6 | 82.3 |
| 39 | 高知県 | 93.4 | 89.9 | 82.3 | 78.4 |
| 40 | 福岡県 | 92.5 | 91.8 | 75.7 | 72.9 |
| 41 | 佐賀県 | 96.6 | 96.3 | 92.3 | 90.0 |
| 42 | 長崎県 | 92.0 | 92.6 | 89.9 | 84.6 |
| 43 | 熊本県 | 90.7 | 92.8 | 91.7 | 84.2 |
| 44 | 大分県 | 93.4 | 91.5 | 85.7 | 79.6 |
| 45 | 宮崎県 | 95.2 | 91.5 | 88.4 | 81.4 |
| 46 | 鹿児島県 | 93.5 | 88.8 | 83.1 | 83.4 |
| 47 | 沖縄県 | 87.9 | 88.1 | 84.3 | 76.8 |
| | 全国 | 94.3 | 91.8 | 85.1 | 77.3 |

*色を付けたのは第1～4期のすべてが90%以上であった県

康局結核感染症課と国立感染症研究所感染症情報センターにより取りまとめられた。また、2006年度から開始された1歳(第1期)と小学校入学前1年間の幼児(第2期)の2回接種についても、同時に接種率調査が行われたので、その結果を表1に紹介する。

麻疹含有ワクチンの接種率は、全国平均で第1期が94.3%、第2期が91.8%、第3期が85.1%、第4期が77.3%で、目標の95%以上にはいず

れの期も到達していなかったが、第1,2期については、90%を越えた。第3,4期については、一層の接種勧奨が必要である。なお、表中で色をつけた山梨県、福井県、佐賀県の3県は、4期とも接種率が90%を越えた県である。一方、接種率が低かった都道府県においては、各自治体に設置されている都道府県麻疹対策会議などが中心となって、接種率向上にむけた自治体をあげた取り組みが期待される。